


Procédures interventionnelle Carnet de suivi PleurX®



Diagnosics
Médicale
Orthopédie
Spécialités interventionnelles
Services

Adhesia is part of the Group

Contenu

Mise en garde..... 3

Renseignements patients..... 4

Les étapes clés du retour à domicile 5

Contenu du kit de drainage 6

Procédure de drainage simplifiée 8

Références utiles du PleurX..... 11

Questions fréquentes 12

Glossaire 15

Suivi de traitement PleurX 16

Mise en garde

Les instructions suivantes sont fournies à titre indicatif. Pour obtenir des informations détaillées, reportez vous à la notice d'utilisation fournie avec le kit de drainage et visionnez la vidéo sur le drainage sur le site www.pleurx.fr

Renseignements patients

Nom : _____

Prénom : _____

Adresse : _____

Numéro de téléphone : _____

N° IPP : _____

Pose préliminaire

M. / Mme _____ vient de bénéficier de la pose d'un cathéter tunnellisé PleurX®.

Au cours de la mise en place, une quantité de ____ mL de liquide a été évacuée.

Au cours de vos déplacements, ayez toujours avec vous :

- Ce guide du suivi de traitement
- La dernière radio de thorax de contrôle

Les étapes clés du retour à domicile

Recommandations aux équipes soignantes :

1. ASSURER UN BON RETOUR A DOMICILE

Les fils peuvent être enlevés sur décision médicale à 10 jours SAUF celui qui tient le PleurX® (à la sortie du cathéter au niveau de la peau), ce dernier fil peut être laissé à demeure sauf intolérance.


2. SECURISER LE SUIVI

Le PleurX® est muni à son extrémité d'une valve étanche. Pour pouvoir aspirer, il faut disposer en HAD d'un kit de drainage avec bouteille sous vide (500 ou 1000ml) + un bouchon de valve de remplacement.

3. AMELIORER LA QUALITE DE VIE A DOMICILE

Le rythme d'aspiration dépend de la situation de chaque patient. Se référer à la prescription du médecin.

Contenu du Kit de drainage



Contenu du Kit de drainage




Présentez-le à votre infirmière en HAD ou à l'équipe médicale à l'hôpital

Procédure de drainage simplifié

Avant de commencer

Préparez tout le matériel de drainage, lavez-vous les mains soigneusement.



1. Ouvrez l'emballage. Dépliez le champ bleu stérile. Placez la bouteille à côté du champ et posez l'extrémité du tube de drainage sur le champ.



2. Ouvrez les emballages des compresses imbibées d'alcool et posez-les sur le champ, à proximité du matériel.




3. Mettez les gants en les prenant par le poignet.




4. Ouvrez l'emballage contenant le capuchon de la valve et laissez-le tomber sur le champ bleu stérile.

Raccorder la bouteille de drainage

Veillez à ce que l'embout du cathéter et l'extrémité du tube de drainage n'entrent pas en contact avec d'autres objets.




5. Fermez le clamp du tube de drainage et retirez le bouchon protecteur du tube.




6. Retirez le capuchon de la valve du cathéter.

Procédure de drainage simplifié



7. Nettoyez l'extérieur de la valve avec la première compresse imbibée.




8. Insérez l'extrémité du tube de drainage dans la valve du cathéter.

Drainage du liquide


Ne pas drainer plus de 1000 ml du thorax ou 2000 ml de l'abdomen à la fois.



9. Retirez la pince de protection du haut de la bouteille de drainage et enfoncez le piston en forme de T.



10. Ouvrez le clamp du tube de drainage pour commencer le drainage.




11. Fermez complètement le clamp du tube lorsque le drainage est terminé.

Procédure de drainage simplifiée

Dernières manipulations et récupération des déchets


En cas de questions ou de difficultés, contactez votre médecin ou votre infirmière.



12. Retirez le tube de drainage de la valve du cathéter et posez-le.




13. Nettoyez l'extérieur de la valve avec la deuxième compresse imbibée.



14. Placez un nouveau capuchon cathéter sur la valve et faites le tourner pour le fermer.



15. Désinfectez le bord du cathéter avec la troisième compresse.



16. Placez la plaque de mousse autour du cathéter et enroulez le dessus. Placez des compresses de gaze par dessus.



17. Posez le pansement adhésif au-dessus des compresses de gaze, retirez le film plastique et jetez le dispositif dans un réceptacle adapté.

Références utiles du PleurX®

	Dispositif médical nécessaire	Réf.
EN HAD	Kit de drainage avec bouteille sous vide (1x10)	
	500 mL	50-7500B
	1000 mL	50-7510

Questions fréquentes

Q : À quelle fréquence dois-je drainer le fluide à partir du thorax ou de l'abdomen ?

R : Vous devez vous faire drainer le fluide tel que votre médecin vous l'a prescrit, en général tous les un à deux jours. Seul le médecin décide de changer la fréquence du drainage.

Q : Que dois-je faire si j'ai du mal à respirer ou si je ressens une gêne à la fin du drainage ?

R : Contactez votre médecin si vous avez du mal à respirer ou si vous ressentez une gêne. Ne jamais drainer plus de 1000 ml de fluide du thorax ou 2000 ml de fluide de l'abdomen.

Q : Comment savoir si le cathéter peut être retiré ?

R : Lorsque durant 3 drainages successifs, moins de 50ml se déversent à chaque fois dans la bouteille, il convient de consulter votre médecin pour savoir si le cathéter peut être retiré ou s'il doit être remplacé (voir la question suivante).

Q : Que signifie la diminution du volume de fluide drainé ou l'absence de fluide drainé ?

R : Si le fluide disparaît soudainement ou si le volume de fluide drainé diminue progressivement, il est possible que le cathéter ou la ligne drainage soient obstrués. Il convient alors de changer de bouteille de drainage. Si le drainage ne démarre pas lorsque votre infirmière utilise une seconde bouteille, appelez votre médecin. Si la quantité de fluide drainé diminue progressivement, le fluide peut se tarir et il est peut-être temps de retirer le cathéter. Reportez-vous à la question précédente.

Questions fréquentes

Q : Combien de temps le cathéter restera dans mon thorax ou abdomen ?

R : Le cathéter restera jusqu'à ce que le fluide cesse de couler. Le délai varie d'un patient à l'autre. L'accumulation de fluide n'est pas susceptible de s'arrêter dans l'abdomen, mais peut s'arrêter dans le thorax. Le cathéter peut rester en place aussi longtemps que vous en aurez besoin.

Q : Que dois-je faire si la couleur du fluide change par rapport à la couleur habituelle ?

R : Tout changement dans l'apparence du fluide doit être signalé à votre médecin.

Q : Pourrais-je prendre une douche ou un bain avec le cathéter en place ?

R : **Douche** : Vous pouvez prendre une douche ou faire une toilette à l'éponge si un pansement adhésif comme celui décrit dans le pack de procédure est correctement fixé sur votre peau. Le pansement adhésif est conçu pour tenir tout fluide à l'écart. Assurez-vous que le pansement soit complètement et fermement fixé et que le cathéter et les compresses de gaze soient sous le pansement. Si la gaze est mouillée au contact de l'eau, enlevez le pansement immédiatement, nettoyez puis séchez la zone. Appliquez un nouveau pansement tel qu'indiqué sous la rubrique « Placer un nouveau pansement ».

R : **Bain** : Ne pas laisser le cathéter tremper sous l'eau dans une baignoire, piscine, etc.

Questions fréquentes

Q : Que dois-je faire si par accident le cathéter PleurX® se détache ?

R : Dans le cas peu probable où le cathéter se détache et que le manchon est exposé, couvrez le site de sortie avec un pansement stérile et consultez immédiatement un médecin. Le cathéter PleurX® a un manchon en polyester qui est normalement sous la peau à l'endroit où le cathéter est inséré. Le manchon et les sutures aident à maintenir le cathéter en place.

Q : Comment savoir si le cathéter est infecté ?

R : Si vous pensez que votre cathéter est infecté, vous devez contacter votre médecin immédiatement. Toute douleur, rougeur (érythème), chaleur au toucher, fièvre ou présence de fluide et tout gonflement (oedème) autour du site du cathéter peut indiquer l'infection du cathéter. Une certaine gêne et des rougeurs apparaissent généralement après l'insertion, mais celles-ci ne doivent pas persister ou s'aggraver.

Glossaire

Glossaire

Ascite : accumulation de liquide dans l'abdomen

Pneumothorax : présence d'air entre la paroi thoracique et les poumons

Collapsus circulatoire : chute de pression artérielle soudaine : choc

Érythème : rougeur de la peau

Œdème : gonflement dû à une surcharge hydrique

Déséquilibre électrolytique : changement dans le niveau normal de certains produits chimiques dans le corps, tels que le sodium ou le potassium

Hypotension : faible pression du sang

Péritoine : membrane qui recouvre la partie intérieure de la cavité abdominale et enveloppe les organes abdominaux

Espace péritonéal : espace dans l'abdomen composé des membranes internes et externes du péritoine

Péritonite : infection du péritoine

Suivi de traitement du PleurX®

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Suivi de traitement du PleurX®

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Suivi de traitement du PleurX®

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Suivi de traitement du PleurX®

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Suivi de traitement du PleurX®

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Suivi de traitement du PleurX®

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Suivi de traitement du PleurX®

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Suivi de traitement du PleurX®

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Suivi de traitement du PleurX®

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Suivi de traitement du PleurX®

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Suivi de traitement du PleurX®

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Suivi de traitement du PleurX®

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Suivi de traitement du PleurX®

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Suivi de traitement du PleurX®

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Suivi de traitement du PleurX®

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Date	Heure	Volume prélevé	Aspect (normal, granuleux, épais, fluide...)

Commentaire :

Suivi de traitement du PleurX®

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement

Couleur (trouble, opaque, clair, présence de sang...)	Nom du soignant	Emargement



26 rue de la Montée
68720 Flaxlanden - France
T +33 (0)3 89 06 14 44
F +33 (0)3 89 06 41 99
@ info@adhesia.com

Diagnostics
Médicale
Orthopédie
Spécialités interventionnelles
Services

www.adhesia.com

ADHESIA propose des gammes complètes d'équipements et de dispositifs médicaux spécialisés avec l'ambition permanente d'offrir sur le marché de la santé des solutions toujours plus innovantes.

Ces solutions nous permettent d'améliorer la qualité du service au patient grâce à 3 divisions expertes : Diagnostics, Spécialités interventionnelles et Médicale.

ADHESIA, l'innovation par la spécialisation.

Dispositifs de classe I stérile, IIa ou IIb selon la directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CE.
Produits marqués CE par le TÜV Product Service GmbH (0123).

Produits non remboursés en France.

© 2011, 2012 CareFusion Corporation ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés. PleurX® est une marque de commerce ou une marque déposée de CareFusion Corporation ou de l'une de ses filiales.

ADHESIA SERVICES



Maintenance/SAV/Hotline

ADHESIA met à votre disposition toute une gamme de maintenances préventives et curatives adaptées à vos attentes.



Formations techniques

ADHESIA organise des formations techniques et propose des simulateurs numériques pour l'auto-formation.