Dermatite atopique Actualités 2021

Pr Sébastien Barbarot

Service de Dermatologie
CHU de Nantes

Prévalence de la DA chez l'enfant

France

- Prévalence (12 derniers mois) enfants 6-12 ans = **17,1 %**
- Prévalence (12 derniers mois) adolescents 12-18 ans = **14,3 %**

FARDEAU

QdV

La majorité des DA sont légères

Conduite à tenir devant une DA modérée à sévère

DA « peau noire/metis »

DA « asiatique »

GALE

Sillon

DERMATOPHYTIE

DERMATITE HERPETIFORME

Conduite à tenir devant une DA modérée à sévère

Optimiser le traitement local :
traitement d'**attaque** vs traitement **d'entretien**

Conduite à tenir devant une DA modérée à sévère

Traitement d'une DA: éducation thérapeutique de base

- 1. Informations sur le caractère chronique**
- 2. Evoquer systématiquement 2 points**
 - Ce n'est pas une « allergie à un produit »
 - Ce n'est pas du à un problème psychologique (stress)
- 3. Réassurance (corticophobie)**
- 4. Modalités d'utilisation précises des soins locaux (démonstration de soins)**
 - Quand dans la journée ?
 - Comment ?
 - Combien ?
 - Combien de temps ?
 - Quand arrêter ?
 - Quand reprendre ?

PLAN D'ACTION PERSONNALISE

CENTRES D'ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Conduite à tenir devant une DA modérée à sévère

Quand passer à un traitement systémique ? une décision complexe

Nouveaux traitements

DERMATITE ATOPIQUE

TRAITEMENTS SYSTEMIQUES disponibles en SEPTEMBRE 2021

DA ADULTE

DA ADO (12-17 ans) et DA enfants (6-11 ans)

Dupilumab

- **2^{ème} ligne chez l'adulte** après échec/intolérance ou > 18 mois ciclosporine
 - Bilan préttt NFS BH creat
 - Bilan bio ts les 6 mois (hyperéosinophilies asymptomatiques)
- **70% de très bonne réponse à 4 mois avec dermocorticoïdes (EASI75)**
- **Très bonne tolérance sauf conjonctivites mineurs à modérées (10-20%)**
- **Informations et conseils tolérance ophtalmologique** (larmes artificielles, cs opht si symptômes)
- **Situations particulières**
 - Aggravations cervico-faciales (5-10% ?)
 - Pso pustuleux (très rare)
 - Pelade(très rare)
 - Arthralgies (très rare)

AMM Asthme, polypose nasosinusienne

AMM **DA Adolescent/enfants en 1^{ère} ligne**

Prurit : bien plus que l'histamine...

Traiter tôt les formes sévères ?

Traiter tôt les formes sévères

Eviter les formes chroniques résistantes ?

Demain : des stratégies adaptées au profil évolutif ?

Conclusion

- La DA est une maladie **très fréquente** (4% adultes/15% enfants)
- Les **formes sévères** représentent 3 à 4% des DA
- La prise en charge doit être **précoce, adaptée à la sévérité, coordonnée** entre professionnels de santé
- **L'Education thérapeutique** est essentielle
- Les **traitements systémiques** nouveaux sont efficaces, semblent mieux tolérés que les anciens mais il faut plus de recul
- La **médecine de précision** pour après-demain ?

JM. CHAVIGNY
C. BERNIER
H. AUBERT
M. DEBONS
F. ELAN
L MENNERON
S. BLOT
D. BAUER
I. GAUVRIT
J-F STALDER
S. BARBAROT

eduderm@chu-nantes.fr