

Famille thérapeutique	DCI / Spécialités	Effets attendus	Modalités d'administration	Surveillance Efficacité / effets indésirables	Pratiques infirmière et conseils patients
Colloïde artificiel constitué d'hydroxyéthylamidon de haut poids moléculaire (POUR INFO formateur Solutés de remplissage vasculaire2 types :- cristalloïdes (ringer lactate)- colloïdes (gélofusine -, Colloïde artificiel – et albumine humaine –colloïde naturel)	Hydroxyéthylamidon VOLUVEN®	Restauration volémique en cas de chocs hypovolémiques (remplissage) AMM indiqué pour femme enceinte , Fort pouvoir de remplissage: Volume pour volume: 1L Voluven correspond à 1 L volume sanguin , ex serum 1 L correspond à 300 ml volume sanguin	IVPoche de 500 ml à 6% ou 10% Expansion volémique persistante pendant 12 à 15h Ne pas mélanger d'autres substances médicamenteuses IV	<u>Efficacité</u> :Compenser l'hypovolémie et amélioration de l'état clinique	Prévoir une voie veineuse spécifique pour le remplissage - Augmentation de la pression artérielle Surveillance pouls (frappé, régulier)Coloration et chaleur des extrémitésConscience (cf signes du choc)
				<u>Effets secondaires</u> :Réaction anaphylactique (frissons, malaise, prurit, dyspnée, urticaire)	Surveillance stricte dans les 1er ml injectés
				Surdosage et donc risque de surcharge volémique avec OAP	Débit de la perfusion adapté pour éviter surcharge Surveillance signes OAP (dyspnée à type de polypnée, cyanose, angoisse, sensation oppression thoracique, tachycardie, orthopnée)Si voie veineuse centrale, surveillance de la PVC (reflet de la volémie)
				Troubles de l'hémostase Risque d'hémodilution	Surveillance ionogramme, numération formule sanguine, TCA
				Dysfonctionnement hépatique: augmentation de l'amylasémie	bilan hépatique
				Risque insuffisance rénale chez le sujet âgé	Surveillance diurèse