


La bobologie au cabinet médical

**E. Mayrargue
Service de Chirurgie infantile
CHU Nantes**

Pierre 12 ans

- ATCD 0
- Douleur mécanique des 2 talons depuis 3 mois
- Quel est le diagnostic le plus probable?


- une maladie de Sever
- une ostéite du calcanéum
- une maladie de Kohler
- un kyste essentiel du calcanéum



une maladie de Sever



une ostéite du calcanéum



une maladie de Kohler



un kyste essentiel du calcanéum

La radiographie permet de

- Confirmer le diagnostic
- Eliminer autre chose


La radiographie permet de

- Confirmer le diagnostic

- Eliminer un autre diagnostic




Le traitement

-  Ostéopathie
-  Semelles orthopédiques
-  Kinésithérapie
-  Adaptation du sport


Le traitement




Ostéopathie



Semelles orthopédiques



Kinésithérapie



Adaptation du sport

Margot, 3 ans

- Impotence fonctionnel du mb sup droit
- Pas de chute mais rattrapé par le bras alors qu'elle trébuchait
- Vous évoquez une pronation douloureuse

- Il s'agit d'une luxation de la tête radiale
- les séquelles sont fréquentes
- Il n'y a jamais de récurrence
- Les épisodes de pronation douloureuse surviennent essentiellement entre 6 mois et 5 ans

● Il s'agit d'une luxation de la tête radiale

● les séquelles sont fréquentes

● Il n'y a jamais de récurrence

● Les épisodes de pronation douloureuse surviennent essentiellement entre 6 mois et 5 ans

Manœuvre de réduction



Quand faire une radio ?

- Pas de mécanisme typique
- Persistance impotence fonctionnelle malgré une ou deux manœuvres de réduction

Diagnostics différentiels?


- Fracture de la palette humérale
- Arthrite septique de coude


Sophie 11 ans

- Traumatisme de la cheville droite à la danse avec traumatisme en inversion
- Œdème en regard de la malléole externe
- Marche possible
- Radio normale

- Vous l'envoyez aux urgences. Le plâtre s'impose
- Une attelle et ça repart
- Bien sûr il faudra de la rééducation
- Le sport pourra être repris dans 1 semaine

 Vous l'envoyez aux urgences. Le plâtre s'impose

 Une attelle et ça repart

 Bien sûr il faudra de la rééducation

 Le sport pourra être repris dans 1 semaine

Julien 3 ans

- Depuis qq semaines le pouce se bloque et depuis hier impossible de le tendre
- Pas de douleur

- C'est une luxation inter phalangienne
- C'est un pouce à ressort
- Nécessite une consultation aux urgences
- Traitement par attelle thermo formée

- C'est une luxation inter phalangienne
- C'est un pouce à ressort
- Nécessite une consultation aux urgences
- Traitement par attelle thermo formée

Jeanne 2 ans

- Chute de sa hauteur, réception sur la paume de la main
- Impotence fonctionnelle MS G, douleur au poignet
- Rx en ville




- Pas de fracture
- Fracture en bois vert du radius
- Fracture motte de beurre du radius
- Fracture sous périostée de l'ulna



Pas de fracture



Fracture en bois vert du radius



Fracture motte de beurre du radius



Fracture sous périostée de l'ulna




- Pas de traitement
- Attelle amovible en manchette
- Plâtre BAB
- Tout est possible




Pas de traitement



Attelle amovible en manchette



Plâtre BAB



Tout est possible


Jean Vincent 3 mois




- Alors là c'est sûr, il faut l'envoyer aux urgences
- Il faut des antibiotiques même si ce n'est pas automatique
- Des soins locaux et tout rentre dans l'ordre
- Ca risque de récidiver....

 Alors là c'est sûr, il faut l'envoyer aux urgences

 Il faut des antibiotiques même si ce n'est pas automatique

 Des soins locaux et tout rentre dans l'ordre

 Ca risque de récidiver....

Drôle d'ongle incarné



Exostose sous unguéale




Bénédicte 11 ans


- Chute de vélo sur le côté droit
- Attitude en torticollis droit
- Douleur à la mobilisation de l'épaule
- Radio: fracture du 1/3 moyen de la clavicule




- Ca va traverser la peau, il faut l'opérer
- Le traitement est orthopédique
- Le risque de pseudarthrose est nul
- Le cal osseux sera volumineux

 Ca va traverser la peau, il faut l'opérer

 Le traitement est orthopédique

 Le risque de pseudarthrose est nul

 Le cal osseux sera volumineux

Karine 2 ans


- Trauma jambe droite en torsion
- Impotence fonctionnel partiel
- Marche avec boiterie d'esquive
- Apyrétique
- Radio:




- La radio est normale
- Fracture spiroïde du tibia
- Immobilisation plâtrée systématique
- Traitement symptomatique



La radio est normale



Fracture spiroïde du tibia



Immobilisation plâtrée systématique



Traitement symptomatique



Je vous remercie