

LISTE DES INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES
AVEC LE
MYCOPHENOLATE
Mycophénolate mofétil - Cellcept®
Mycophénolate sodique - Myfortic®

Quatre niveaux de contrainte sont définis :

Contre-indication	Elle revêt un caractère absolu et ne doit pas être transgressée
Association déconseillée	Elle doit être le plus souvent évitée, sauf après examen approfondi du rapport bénéfice/risque, et impose une surveillance étroite du patient.
Précaution d'emploi	C'est le cas le plus fréquent. L'association est possible dès lors que sont respectées, notamment en début de traitement, les recommandations simples permettant d'éviter la survenue de l'interaction (adaptation posologique, renforcement de la surveillance clinique, biologique, ECG, etc...).
A prendre en compte	Le risque d'interaction médicamenteuse existe, et correspond le plus souvent à une addition d'effets indésirables. Aucune recommandation pratique ne peut être proposée. Il revient au médecin d'évaluer l'opportunité de l'association.

MOLECULE	MECANISME DE L'INTERACTION	NIVEAU DE CONTRAINTE	CONDUITE A TENIR
<u>Pénicilline A</u> : amoxicilline, ampicilline, ticarcilline	Diminution des concentrations de l'acide mycophénolique d'environ un tiers, avec risque potentiel de baisse d'efficacité.	Prendre en compte	
<u>IPP</u> : ésoméprazole, lansoprazole, oméprazole, pantoprazole, rabéprazole	Diminution des concentrations de l'acide mycophénolique d'environ un tiers, avec risque potentiel de baisse d'efficacité.	Prendre en compte	
<u>Fluoroquinolone</u> : ciprofloxacine, énoxacine, lévofloxacine, loméfloxacine, moxifloxacine, norfloxacine, ofloxacine, péfloxacine	Diminution des concentrations de l'acide mycophénolique d'environ un tiers, avec risque potentiel de baisse d'efficacité.	Prendre en compte	
VACCINS			
<u>Vaccin vivant atténué</u> : BCG, fièvre jaune, varicelle, oreillons, rougeole, rubéole	Risque de maladie généralisée éventuellement mortelle. Ce risque est majoré chez les sujets âgés déjà immunodéprimés par la maladie sous-jacente.	Contre indication	Utiliser un vaccin inactivé lorsqu'il existe (poliomyélite).
<u>Vaccin inactivé</u> : grippe, DTP, coqueluche, Haemophilus, méningocoque, papillomavirus, hépatites, pneumocoque	Risque d'inefficacité de la vaccination.	Prendre en compte	Vaccinations à réaliser dans un délai minimum de 6 mois après la greffe.
Globulines antilymphocytaires	Immunodépression excessive avec risque de lymphoprolifération	Pendre en compte	

SOURCES :

[1] Thériaque, disponible sur www.theriaque.org , dernière consultation avril 2013

[2] Thésaurus – ANSM, disponible sur <http://ansm.sante.fr> , dernière consultation avril 2013

[3] Haut Conseil de la Santé Publique – Avis relatif aux recommandations vaccinales spécifiques des personnes immunodéprimées ou aspléniques (16 février 2012)

