



# Pathologies des organes génitaux externes

9<sup>ème</sup> Journée  
Questions et  
controverses en  
pédiatrie

Dr Guinot  
Chirurgie  
Pédiatrique

# + Pathologies du prépuce


## ■ Phimosis :

- Pas de traitement avant l'âge de 5 à 6 ans.
- Exceptions :
  - Balanoposthites à répétition
  - Dysurie, mictions sous préputiales
  - Pyélonéphrites dans un contexte d'uropathie






- Traitement :
  - 1<sup>ère</sup> intention : CORTICOTHERAPIE LOCALE
  - Bétaméthasone crème 0,1 % +++ = BETNEVAL
    - 1 application matin et soir pendant 6 semaines
    - Pas d'effet systémique
    - Entretenir avec décalottage plusieurs fois par jour
  
- Si échec :
  - Plastie d'élargissement du prépuce (Duhamel) en 1<sup>ère</sup> intention
  - Circoncision : si échec de plastie, prépuce très long, lichen





## + Circoncision et aspects juridiques

- Toute atteinte volontaire au corps d'autrui est interdite : il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne
- Donc en l'absence d'intérêt thérapeutique la circoncision peut être considérée comme une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne.
- Pas de circoncision en l'absence d'intérêt thérapeutique
- Autorisation des 2 parents obligatoire





# + Circumcision ...







+ Aspect normal



+ Smegma





- Adhérences balanopréputiales :
  - Physiologiques
  - Jamais de libération chirurgicales
  - Libération progressives avec la croissance et les soins d'hygiène.






## ■ Paraphimosis



=> Réduction en urgence

Consultation en chirurgie à distance



## ■ Balanoposthite :

### ■ Soins locaux :


- eau + savon
- Antiseptique (Chlorhexidine)
- Parfois antibiotique (Augmentin)



- Si répétition : consultation en chirurgie



- Verge enfouie :
  - Consultation en chirurgie



# + Hypospadias


Hypospadias distaux : Consultation en chirurgie entre 6 et 9 mois







## Hypospadias proximaux : consultation dans le 1<sup>er</sup> mois

- Vérifier la présence et la position des testicules
- Juger de la nécessité d'un traitement hormonal



+ Qu'est ce que c'est ?





# + Pathologies des testicules

## ■ Testicules :


### ■ Cryptorchidie vraie :

- Pas de descente du testicule après l'âge de 6 mois = consultation de chirurgie pédiatrique dès l'âge de 6 mois. Chirurgie entre 9 et 12 mois.


### ■ Testicules oscillants :

- Pas d'indication chirurgicale.
- Surveillance 1 fois/an jusqu'à la puberté.

### ■ Cryptorchidie secondaire



+ Qu'est ce que c'est ?




# + Bourse aiguë


- Torsion testicule :
  - 2 pics : néonatale, adolescence
- Torsion hydatide
- Epididymite

=> Bourse douloureuse aiguë = avis chirurgical

=> Toute douleur abdominale garçon =  
EXAMEN des OGE



# + Pathologie du canal péritonéovaginal




# + Hernie inguinale






■ Diagnostic différentiel +++



Hydrocèle


Kyste du cordon

# + Hydrocèle



# + Kyste du cordon





- Hydrocèle et kystes du cordon :
  - Consultation en chirurgie sans urgences
  - Pas de chirurgie avant l'âge de 3 ans


- SAUF




# + Pathologie des OGE féminins


- Coalescence des petites lèvres :
  - Libération progressive avec la croissance
  - Pas d'indication chirurgicale
  - Pas de traitement





- Imperforation hyménéale chez le nourrisson:
  - Consultation de chirurgie pédiatrique
  - Sans urgence





## Imperforation hyménéale chez l'adolescente : hématoocolpos

- Douleurs abdominales aiguës
- Crises douloureuses récidivantes
- Pas de latéralisation de la douleur
- Pas de fièvre.
- Pas de signes fonctionnels urinaires
- Patiente pubère non réglée



# Hernie inguinale :



Nouveau né – 6mois :


- **Hernie ovaire**
- Pas de réduction !!!!!
- Consultation en chirurgie rapide (dans la semaine)

Petite fille :

- **Hernie inguinale digestive**
- Réduction si engouée
- Consultation en chirurgie sans urgence




+ Qu'est qu'elle a ?




# Epispade féminine :



## + Excroissance de la marge anale





Merci de votre attention