

Les médicaments protecteurs gastriques



INEXIUM® (Esomeprazole)

La dénomination commune internationale

L'ésoméprazole est la molécule active du médicament. INEXIUM® est le nom commercial.

Il se présente sous forme de comprimés pelliculés gastrorésistants à 20 mg et 40 mg ou de sachets buvables de granulés gastrorésistants à 10 mg.

A quoi ça sert ? Comment ça marche ?

Mon traitement immunosuppresseur peut provoquer divers troubles digestifs dont des sensations de brûlures au niveau de l'estomac. L'INEXIUM® a pour but de prévenir ces brûlures en diminuant la sécrétion d'acide gastrique.

Quand et comment prendre mon traitement ?

- Je dois prendre l'INEXIUM® le soir. Les comprimés doivent être avalés entiers avec une boisson. Ils ne doivent pas être mâchés ni croqués.
- Chez les patients ayant des difficultés pour avaler, les comprimés peuvent aussi être dispersés dans un demi-verre d'eau non gazeuse. La solution doit être bue dans les 30 minutes après préparation. Rincer le verre avec un demi-verre d'eau et le boire. Les granules ne doivent pas être mâchés ni croqués.

Conservation des médicaments

A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C, dans l'emballage extérieur d'origine, à l'abri de l'humidité.

GELOX® (monmectite, hydroxydes d'aluminium et de magnésium)

La dénomination commune internationale

La monmectite et les hydroxydes d'aluminium et de magnésium sont les molécules actives du médicament. GELOX® est le nom commercial.

Il se présente sous forme de suspension buvable en sachet.

A quoi ça sert ? Comment ça marche ?

Mon traitement immunosuppresseur peut provoquer divers troubles digestifs. Le GELOX® est un « antiacide » qui prévient les brûlures au niveau de l'estomac.

Quand et comment prendre mon traitement ?

- Je prends un sachet 30 minutes après le(s) repas.
- Je dois bien malaxer le sachet avant de l'ouvrir
- Le contenu du sachet peut être avalé pur ou dilué dans un demi-verre d'eau.

Que dois-je savoir ?

Les antiacides interagissent avec certains autres médicaments pris par voie orale, notamment les médicaments immunosuppresseurs (PROGRAF® ADVAGRAF®, IMUREL®, NEORAL®, CERTICAN®, CELLCEPT®...). Je dois donc prendre GELOX® à distance (2 heures) de mes autres médicaments. En pratique, je le prends 30 minutes après le(s) repas, ou au moment des douleurs.

Conservation des médicaments

A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C, dans l'emballage extérieur d'origine, à l'abri de l'humidité.