

MES MEDICAMENTS ANTI-REJET : CONDUITE A TENIR SI :

OUBLI DE PRISE

Pour **CELLCEPT® - PROGRAF® - MYFORTIC®** :


Je me rends compte de l'oubli :

- dans les **6 premières heures** après ma prise habituelle
→ **PRISE DE LA DOSE HABITUELLE** le plus tôt possible
- au-delà des **6 premières heures** après ma prise habituelle
→ **PAS DE PRISE DE LA DOSE**
→ Prendre la dose suivante aux horaires habituels **sans jamais la doubler**

Pour **ADVAGRAF®** :

Je me rends compte de l'oubli :

- dans les **12 premières heures** après ma prise habituelle
→ **PRISE DE LA DOSE HABITUELLE** le plus tôt possible
- au-delà les **12 premières heures** après sa prise habituelle
→ **PAS DE PRISE DE LA DOSE**
→ Prendre la dose suivante aux horaires habituels **sans jamais la doubler**



VOMISSEMENTS

Si je vomis **dans les 30 minutes** après la prise de mon traitement anti-rejet

→ **REPRISE DE LA DOSE HABITUELLE** et surveillance

Si je vomis **au-delà de 30 minutes** après la prise de mon traitement anti-rejet

→ **PAS DE PRISE D'UNE NOUVELLE DOSE**
→ Prendre la dose suivante aux horaires habituels sans jamais la doubler

